Algoritme ter beoordeling nieuwe patiënt

Man

Start de behandeling met lenalidomide. Gebruik van een condoom is vereist bij seksueel contact (zelfs na een vasectomie):

- tijdens de hele behandelingsduur met lenalidomide,
- tijdens onderbrekingen van de behandeling en
- tot ten minste 7 dagen na het beëindigen van de behandeling,

als de partner zwanger is of zwanger kan worden en geen effectieve anticonceptiemethode toepast.

Vrouw

Kan NIET zwanger worden

Aan minstens één criterium moet worden voldaan:

- Leeftijd ≥ 50 jaar en door natuurlijke oorzaak ≥ 1 jaar niet gemenstrueerd (het uitblijven van de menstruatie na kankertherapie of in de periode dat borstvoeding wordt gegeven, sluit de mogelijkheid van zwangerschap niet uit).
- Eerdere bilaterale salpingo-oöforectomie of hysterectomie.
- Prematuur falen van de ovariumfunctie, bevestigd door een gynaecoloog.
- XY-genotype, Turner-syndroom of agenesie van de uterus.

Start de behandeling met lenalidomide. Anticonceptie en zwangerschapstesten zijn niet vereist.

Kan zwanger worden

Als de patiënt nog geen effectieve anticonceptie toepast, dient hier minimaal 4 weken voor aanvang van de behandeling mee gestart te worden, tenzij de patiënt zich verplicht tot volledige en voortdurende seksuele onthouding.

Effectieve anticonceptie:

- implantaat,
- levonorgestrel-afgevend spiraaltje,
- medroxyprogesteronacetaat depot,
- tubaire sterilisatie,
- partner die is gesteriliseerd d.m.v. vasectomie,
- ovulatieremmende anticonceptiepil met alleen progesteron (bijv. desogestrel).

De anticonceptie wordt voortgezet tijdens de behandeling, inclusief onderbrekingen van de behandeling en tot ten minste 4 weken na het beëindigen van de behandeling.

Zwangerschapstest na ten minste 4 weken effectieve anticonceptie (zelfs bij seksuele onthouding).

Negatief

Start de behandeling met lenalidomide. Zwangerschapstest minimaal elke 4 weken (zelfs bij seksuele onthouding).

Positief

BEGIN NIET MET DE BEHANDELING MET LENALIDOMIDE.