

80 mm



D032391-00

PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART

**Dabigatran etexilaat Accord
dabigatran etexilaat**

accord

- De verzorger/u moet deze kaart altijd bij zich hebben.
- Zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie heeft.

[26-05-2023]

Beste patiënt/verzorger van een patiënt in de kindertijd,

U/uw kind krijgt Dabigatran etexilaat Accord van de arts. In de bijsluiter staat belangrijke informatie over dit geneesmiddel. Zo kunt u/kan uw kind dit geneesmiddel veilig gebruiken. Het is belangrijk dat u/uw kind deze waarschuwingskaart altijd bij u/zich heeft. Er staat namelijk belangrijke informatie op over uw behandeling/de behandeling van uw kind. Op deze manier weten zorgverleners dat uw kind dit geneesmiddel gebruikt.

**Dabigatran etexilaat Accord informatie voor de patiënt/
verzorger van een patiënt in de kindertijd**

Over uw behandeling/de behandeling van uw kind

- Dit geneesmiddel verdunt het bloed. Het wordt gebruikt om bestaande bloedpropjes te behandelen of om de vorming van gevaarlijke bloedpropjes te voorkomen.
- Houd u aan de instructies van uw arts/de arts van uw kind als u/uw kind dit geneesmiddel gebruikt. Sla nooit een dosis over. Stop ook niet zomaar met het gebruik van dit geneesmiddel. Overleg altijd eerst met uw arts/de arts van uw kind of u/uw kind met dit middel mag stoppen.
- Vertel uw arts/de arts van uw kind over alle geneesmiddelen die u/uw kind nu gebruikt.
- Krijgt u/uw kind een operatie of een andere ingreep? Vertel uw arts/de arts van uw kind over het gebruik van Dabigatran etexilaat Accord.
- Dabigatran etexilaat Accord kan bij het eten worden ingenomen, maar dat hoeft niet. U/uw kind moet de capsule heel doorslikken met een glas water. U/uw kind mag de capsule niet breken, openmaken of erop kauwen. U/uw kind mag de bolletjes er niet uithalen.

Wanneer moet u medische hulp inroepen

- Neem direct contact op met uw arts/de arts van uw kind als u/uw kind last krijgt van een van de volgende mogelijke klachten en symptomen van een bloeding, zoals:
 - zwelling
 - ongemak
 - ongewone pijn of hoofdpijn
 - duizelig zijn
 - minder kleur in uw gezicht
 - zwakte
 - ongewone blauwe plekken
 - bloedneus
 - bloedend tandvlees
 - ongewoon lang bloeden na een snijwond
 - ongewone menstruatiebloedingen of vaginale bloedingen
 - bloed in de plas, waardoor de plas roze of bruin van kleur is
 - rode/zwarte ontlasting

192 mm

48 mm

Fold here

48 mm

Fold here

48 mm

Fold here

48 mm

80 mm

- ophoesten van bloed
- overgeven van bloed of koffiedikachtig braaksel.

Door gebruik van Dabigatran etexilaat Accord kan de kans op bloedingen toenemen.

- Als u/uw kind valt of een verwonding oploopt (vooral als u/uw kind het hoofd stoot), roep dan direct medische hulp in.
- Krijgt u/uw kind last van brandend maagzuur, misselijkheid, overgeven, maagklachten, een opgeblazen gevoel of pijn in de bovenbuik? Stop dan niet met het gebruik van Dabigatran etexilaat Accord zonder met uw arts/de arts van uw kind te overleggen.

Dabigatran etexilaat Accord informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

- Dabigatran etexilaat Accord is een oraal antistollingsmiddel (directe trombineremmer).
- Dabigatran etexilaat Accord moet mogelijk vóór een chirurgische of andere invasieve ingreep worden gestaakt.
- In geval van een grote bloeding moet Dabigatran etexilaat Accord onmiddellijk worden gestaakt.
- Een specifiek antidotum (idarucizumab) is beschikbaar voor volwassen patiënten. De werkzaamheid en veiligheid van het specifieke antidotum idarucizumab bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld. Voor details en voor meer advies voor het tegengaan van het antistollingseffect van Dabigatran etexilaat Accord, zie de Samenvatting van de productkenmerken van Dabigatran etexilaat Accord en idarucizumab.
- Dabigatran etexilaat Accord wordt hoofdzakelijk via de nieren uitgescheiden; er moet een adequate urineproductie worden gehandhaafd. Dabigatran etexilaat Accord is dialyseerbaar.

Vul dit gedeelte in of vraag uw arts/de arts van uw kind om dit voor u/uw kind te doen.

Patiëntgegevens

Naam van de patiënt

Geboortedatum

Indicatie voor de antistolling

Dosis van Dabigatran etexilaat Accord

BBBB7595



192 mm