



Front side of patient alert card



Back side of patient alert card



Front side of patient alert card

26 mm

10 mm

74 mm

90 mm

Indien u een vrouw bent die zwanger kan worden, lees dan deze pagina zorgvuldig

Zwangerschap
 Bosentan kan schade toebrengen aan de ontwikkeling van de foetus. Daarom mag u geen bosentan gebruiken als u zwanger bent en mag u niet zwanger worden als u bosentan gebruikt. Bovendien, indien u lijdt aan pulmonale hypertensie, kan zwangerschap de symptomen van uw ziekte ernstig versterken. Indien u vermoedt dat u zwanger bent, vertel dit aan uw arts of aan uw gynaecoloog.

Anticonceptie
 Hormonale voorbehoedsmiddelen – zoals orale anticonceptiva, de pil, hormooninjecties, implantaten of anticonceptiepleisters – zijn niet betrouwbaar bij het voorkomen van een zwangerschap bij vrouwen die bosentan gebruiken. U dient tevens een barrièremethode te gebruiken – zoals een condoom, pessarium of vaginale spons – naast de genoemde vormen van hormonale voorbehoedsmiddelen. Bespreek iedere eventuele vraag met uw arts of uw gynaecoloog – vul de achterzijde van deze kaart in en geef deze aan uw arts of gynaecoloog bij de volgende afspraak.
 U dient een zwangerschapstest te doen vóór u met bosentan begint en vervolgens iedere maand van de behandeling, zelfs als u denkt dat u niet zwanger bent..

Datum van de eerste maandelijkse test:

Bloedtests voor het bepalen van de leverfunctie

Bij sommige patiënten die bosentan innamen, werd een abnormale leverfunctie waargenomen. Tijdens de behandeling met bosentan zal uw arts zorgen voor regelmatige bloedtests om uw leverfunctie te controleren.
Denk eraan om iedere maand een bloedtest voor de leverfunctie te laten uitvoeren. Twee weken na een dosisverhoging zal een extra test worden gedaan.

Datum van de eerste maandelijkse test:

Uw schema voor maandelijkse leverfunctietests:

jan feb mar apr mei jun

jul aug sep okt nov dec

Back side of patient alert card