

# Waarschuwingskaart voor de patiënt

NL

## Apixaban Accord (apixaban)

Het is belangrijk dat u deze kaart altijd bij u draagt

**Laat deze kaart zien aan uw apotheker, uw tandarts en alle andere medische zorgverleners waar u onder behandeling bent.**

### Informatie voor patiënten

- Gebruik Apixaban Accord altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Als u een dosis heeft gemist, neem deze dan zodra u eraan denkt en houdt u daarna weer aan uw gebruikelijke doseerschema.
  - Stop niet met het innemen van Apixaban Accord zonder overleg met uw arts, omdat u risico loopt op een beroerte of andere problemen als gevolg van het ontstaan van een bloedstolsel.
  - Apixaban Accord helpt uw bloed dunner te maken. Dit kan echter zorgen voor een verhoging van het risico op bloedingen.
- 
- Tekenen en signalen van bloedingen kunnen bijvoorbeeld zijn: blauwe plekken of bloedingen onder de huid, donkergekleurde ontlasting (bloed in de ontlasting), bloed in de urine, bloedneus, duizeligheid, vermoeidheid, bleek zien, zwakte, plotselinge ernstige hoofdpijn, ophoesten van bloed of braken van bloed.
  - Als u last heeft van bloedingen die niet vanzelf stoppen, **zoek dan onmiddellijk medische hulp.**
  - Als u een operatie of een invasieve procedure moet ondergaan, vertel uw behandelend arts dan dat u Apixaban Accord gebruikt.

# Ik ben onder behandeling voor antistolling middels Apixaban Accord (apixaban) ter preventie van bloedstolsels

## Informatie voor medische zorgverleners

- Apixaban Accord (apixaban) is een orale anticoagulant die werkt door directe selectieve remming van factor- Xa.
- Apixaban Accord kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van ernstige bloedingen moet de behandeling met Apixaban Accord direct gestaakt worden.
- Bij de behandeling met Apixaban Accord is routinematige monitoring van de blootstelling niet noodzakelijk. Een gekalibreerde kwantitatieve anti-factor-Xa-assay kan in uitzonderlijke situaties nuttig zijn, zoals in geval van overdosis en noodchirurgie (protrombinetijd (PT internationale genormaliseerde ratio (INR) en een en geactiveerde partiële tromboplastinetijd (PTT) stollingstest worden niet aanbevolen) zie de Samenvatting van Productkenmerken.
- Een middel om de anti-factor-Xa-activiteit van apixaban om te keren is beschikbaar.

## Gelieve dit gedeelte in te vullen of vraag uw arts dit te doen

Naam: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Indicatie: \_\_\_\_\_

Dosering: \_\_\_\_\_ mg tweemaal daags

Naam van de arts: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer van de arts: \_\_\_\_\_